Jext®

150 - 300 MICROGRAMMES
ADRÉNALINE

STYLO AUTO-INJECTEUR D'ADRÉNALINE

Mode d'emploi

Jext 150 microgram
Solution injectable en stylo pré-rempli.
Adrénaline.
Voie intramusculaire.
1 dose.
Enlever le bouchon jaune.
Remove yellow cap.
Placer l'extrémité noire sur la face extérieure de la cuisse, puis presser fermement l'injecteur sur la cuisse jusqu'à entendre le déclic.
Maintenir en position 10 secondes.
Place black tip against outer thigh, then push injector firmly into thigh until it "clicks" & hold for 10 seconds
10 SEC
CLICK
Pointe de l'aiguille
Needle End
Jext 300 microgram
Solution injectable en stylo pré-rempli.
Adrénaline.
Voie intramusculaire.
1 dose.
Enlever le bouchon jaune.
Remove yellow cap.
Placer l'extrémité noire sur la face extérieure de la cuisse, puis presser fermement l'injecteur sur la cuisse jusqu'à entendre le déclic.
Maintenir en position 10 secondes.
Place black tip against outer thigh, then push injector firmly into thigh until it "clicks" & hold for 10 seconds
10 SEC
CLICK
Pointe de l'aiguille
Needle End

Jext® est un dispositif d'auto-injection contenant une solution stérile d'adrénaline. Il est destiné à l'injection d'urgence d'une dose unique d'adrénaline dans la partie extérieure du muscle de la cuisse (injection intramusculaire). Jext® est indiqué dans le traitement d'urgence des réactions allergiques graves et soudaines (choc anaphylactique) provoquées par les piqûres ou les morsures d'insectes, les aliments, les médicaments ou induites par un exercice physique.

ALK

- **Prenez le stylo injecteur Jext® dans votre main dominante** (celle que vous utilisez pour écrire) avec votre pouce le plus près possible du bouchon jaune.
- Attention, une injection accidentelle dans la main ou le pied peut provoquer un défaut d'irrigation sanguine de l'extrémité du membre concerné. En cas d'injection accidentelle dans ces zones, consultez immédiatement le service des urgences de l'hôpital le plus proche pour bénéficier d'un traitement.

1



- **Retirez le bouchon jaune** avec l'autre main.

2

- **Placez l'extrémité noire du stylo injecteur contre la face extérieure de votre cuisse,** tenez l'injecteur à angle droit de la cuisse (environ 90°).

3

- **Pressez fermement l'extrémité noire** contre l'extérieur de votre cuisse jusqu'à ce que vous entendiez le **déclic** confirmant le début de l'injection, **maintenez-le en position.**
- **Tenez fermement l'injecteur en place** contre la cuisse pendant 10 secondes **puis retirez.**
- L'extrémité noire s'étire automatiquement pour recouvrir l'aiguille.

4

- Massez la zone d'injection pendant 10 secondes.

5

Appelez le 15 ou le 112.

- Dites que vous faites un choc anaphylactique et que vous avez reçu une injection intramusculaire d'adrénaline

Le professionnel de santé qui vous prendra en charge récupérera le stylo injectable utilisé.

Attention : une seconde injection peut-être nécessaire si les symptomes persistent après 5 à 15 minutes. **C'est pourquoi vous devez toujours avoir 2 stylos sur vous.**

Les outils d'apprentissage à votre disposition

Pour limiter les risques d'erreur d'administration

Le simulateur Jext®

disponible sur demande par e-mail :
pvinfomed@alk.net



Une vidéo d'apprentissage

accessible via le site internet d'ALK
www.alk.fr

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité de ce médicament.

1057704-03/15

INFORMATION MÉDICALE
Tél. : 01 41 02 86 99 - Fax : 03 29 80 24 34

ALLERGY UNLOCKED

ALK